



Conhecendo os insetos parecidos com os barbeiros




Willian Marques, 2006

Alguns dos insetos parecidos com os barbeiros podem se alimentar somente de plantas.



Inseto fitófago – o aparelho bucal é bastante longo. Ele só alimenta-se das plantas.

Outros insetos parecidos com barbeiros alimentam-se somente de outros insetos.



Inseto predador – o aparelho bucal é curto com três segmentos e fortemente recurvado. Ele alimenta-se de outros insetos.

Os barbeiros alimentam-se de sangue de animais inclusive do homem.



Insetos adultos (machos e fêmeas) e até mesmos as formas jovens deste inseto se alimentam de sangue.

Os barbeiros colocam seus ovos no local onde vivem. Para alcançar a forma adulta eles passam pela fase de ovo e trocam 5 vezes de pele.



Ovos

Ninfa saindo do ovo



Macho

Fêmea



Ninfa 5



Ninfa 4



Ninfa 3



Ninfa 2




Ninfa 1

Muitas pessoas apresentam reação alérgica no local da picada do barbeiro. A pele pode ficar bastante avermelhada.





TRANSMISSÃO VETORIAL

Os parasitos que causam a doença de Chagas são transmitidos pela fezes dos barbeiros.



Rey, 1996





TRANSMISSÃO ORAL

Os parasitos que causam a doença de Chagas também podem ser transmitidos através da ingestão de alimentos como sucos que tenham estado em contato com os barbeiros ou através de carne de caça.



Os barbeiros atraídos pela luz, podem cair no suco durante sua preparação.

Alguns animais silvestres tem circulando no sangue o parasito causador da doença de Chagas, que podem ser transmitido ao homem durante seu manuseio .



TRANSMISSÃO TRANSFUSIONAL

Através do sangue contaminado de portadores com os parasitos, mas sem os sintomas.




TRANSMISSÃO VIA PLACENTA


A mãe pode contaminar seu filho através da placenta ou do leite materno



□ Os barbeiros são bastante ecléticos na escolha de seus nichos ecológicos em ambiente natural



□ O inseto barbeiro pode ser encontrado em diversos nichos ecológicos no ambiente peridomiciliar



No intradomicílio estes insetos buscam locais escuros para se abrigarem.

Algumas medidas pode ser tomadas para evitar que esses insetos passem a viver dentro das casas.



Periodicamente as camas devem ter os colchões levantados e expostos a luz solar.

Cuide de objetos pendurados nas paredes, pois atrás das imagens e retratos os barbeiros encontram esconderijo.



Evite animais dormindo dentro de casa.

